

-вдох и мы сожалеем о потерянном времени. Сначала это может показаться странным, но это нормально. Это может быть опасно, если вы не будете знать, что делать.

## Как помочь?

### Если у Вас появились подозрения, что подросток употребляет наркотики:

- не впадайте в панику;
- обсудите проблему со спутником жизни;
- откровенно поговорите с ребенком, стараясь избегать упреков;
- обсуждайте неправильное поведение ребенка, а не его самого, покажите, что Вы его любите;
- не обвиняйте себя в том, что ребенок употребляет наркотики;
- Убедите его обратится к специалисту

## Детские телефоны доверия

Служба единого общероссийского «Детского телефона доверия»  
(российский)



**8-800-2000-122**

Служба единого общероссийского «Телефона доверия»



(республиканский)

**8-8212-21-11-66**

Телефон кризисных состояний экстренной психологической помощи в РК



**129**



## Памятка для родителей

Следует избегать этого, если Вы знаете, что Ваш ребенок употребляет наркотики. Важно помнить, что это может быть опасно, если вы не будете знать, что делать.

# Родителям о наркотиках

Памятка для родителей  
«Раннее выявление злоупотребления психоактивных веществ у подростков»

# Дети и наркотики

У Вас появилось подозрение, что Ваш ребенок употребляет алкоголь или наркотики? В наши дни многое подростки «экспериментируют» с алкоголем и наркотиками. Вам надо знать, что симптомы зависимости от наркотиков чаще всего напоминают другие подростковые проблемы: гиперактивность, тенденцию к изоляции, поведенческие проблемы.

## Почему дети употребляют наркотические вещества?

Чаще всего дети употребляют наркотики из любопытства и подражая негативному примеру окружающих. Быть подростком - одной ногой стоять в мире взрослых, а другой еще в детстве - это очень сложное состояние.

Очень часто в семье преобладает эмоциональный «голод», отсутствуют доверительные отношения между родителями и подростком. Это усиливает чувство неуверенности в себе и одиночества у подростка, что является одной из причин обращения подростка к наркотикам.

## Героин и другие опиаты

**Способ употребления:** Инъекционный путь или вдыхание, курение, втирание в слизистые полости рта.

**Настораживает наличие:** Шприцы, иглы и упаковки от них; вощенные бумажки; фольга; закопченные столовые ложки.

**Признаки:** Следы уколов, кожа бледная, зрачок узкий, не расширяется даже в темноте, пульс снижен, малая чувствительность к физической боли. На стадии абstinенции признаки, напоминающие простуду: насморк, озноб, тошнота, боль в животе, возможны рвота и понос: судороги. Излишняя общительность; эйфория, бодрость, частые смены настроения, рассеянность и задумчивость.

## Марихуана

**Способ употребления:** Курение.

**Настораживает наличие:** Пустые папироcные гильзы; табак; фольга; бумага для самокруток.

**Признаки:** Бледность кожных покровов, покраснение и отек глазных яблок, склер и век, покраснение губ; сухость во рту, учащение пульса, повышение давления, сладковатый запах от одежды. Активность, подвижность, суетливость, сбивчивая, и

## Признаки и симптомы, которые указывают на то, что ребенок употребляет наркотики:

- скрытность, необщительность, избегание контакта с родными;
- изоляция;
- смена друзей;
- внезапные колебания настроения;
- изменения интересов, потеря прежних увлечений;
- изменение отношений в семье, к учебе (снижение успеваемости, пропуски уроков);
- занимает или крадет деньги, из дома пропадают вещи;
- коллекционирование неадекватных предметов (сигаретные бумажки, упаковки от таблеток, тюбики клея, предметы для в/в инъекций);
- физические симптомы: потеря веса, следы инъекций, неуверенные движения, частый насморк, бледная, землистая кожа.

**Уважаемые родители!** Если в характере и поведении Вашего ребенка появился хотя бы один из выше перечисленных признаков, то Вам необходимо:

1. Взять и обсудить всей семьей возникшее подозрение.
2. Объяснить ребенку в доступной форме причины данного разговора без излишней эмоциональности, проявив максимум тактичности.

торопливая речь, повышенная веселость, «волчий» аппетит. Через несколько часов смена настроения: агрессия, вспыльчивость, беспричинная тревога; страхи.

## Кокаин и другие психостимуляторы

**Способ употребления:** Вдыхание через нос (кокаин); курение (кокаин, крэк); инъекции (первитин).

**Настораживает наличие:** Соломинки; самодельные трубочки из фольги или вошеной бумаги; аптечные весы; эфир, нашатель, сода.

**Признаки:** бледность кожных покровов; сухость во рту, учащенный пульс, расширенные зрачки; озноб, потливость, понос, неуверенные движения, нарушенная координация. Оживление, невозможность усидеть на одном месте, деятельность, лишенная смысла, скачущие мысли. На стадии абstinенции - пассивность, раздражительность, депрессии, тревожная мнительность, галлюцинации.

## Растворители и клей

**Способ употребления:** вдыхание паров. Характерно для раннего подросткового возраста.

Не оставайтесь с возникшими вопросами и проблемами наедине. Не бойтесь обращаться к специалистам за консультацией и помощью. Чем раньше оказана помощь, тем благоприятнее прогноз.

## Факторы защиты от наркотиков:

- крепкая связь с родителями (семьей);
- родители уделяют внимание поведению своих детей, знают друзей, постоянно вовлечены в их жизнь и дают им ясные представления о поведении внутри и вне семьи;
- воспитание в ребенке самостоятельности, ответственности за свои действия и поступки, чувства достоинства и самоуважения;
- развитое умение праздновать, играть весело без алкоголя и наркотиков;
- сформированные ценности здорового образа жизни;
- интерес к учебе, хобби, духовному росту;
- уважение к общественным нормам, законам, правилам.

**Настораживает наличие:** Тюбики, банки препаратами бытовой химии, смоченные тряпки, целлофановые пакеты с резким запахом.

**Признаки:** Мутные глаза, отечное лицо, серовато-земленистый оттенок кожи, ломкость волос и ногтей, запах растворителя от одежды. Невнятная смазанная громкая речь, шаткая походка, активная жестикуляция. Состояние напоминает алкогольное опьянение. Всплески агрессии; галлюцинации («мультяшки»). Через несколько часов вялость, сонливость, жалобы на усталость.

## Галлюциногены

**Способ употребления:** Помещаются под язык для рассасывания. **Настораживает наличие:** мелкие квадратики фильтровальной бумаги; редко таблетки, капсулы, раствор-гель.

**Признаки:** Повышение температуры и давления; расширение зрачков. Странность восприятия предметного мира, его «одушевление»; изменение цветовосприятия; замедленность движений и речи; беседы с самим собой; нарушение ориентировки во времени и пространстве.